



**PROCESSO SELETIVO PARA RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL
E EM ÁREA PROFISSIONAL DA SAÚDE
EDITAL PROPPG UFERSA 51/2022**



PROVA ESCRITA OBJETIVA
CADERNO DE QUESTÕES

ÁREA: CLÍNICA MÉDICA DE PEQUENOS ANIMAIS

CANDIDATO	Nº INSCRIÇÃO

INSTRUÇÕES

- A prova terá duração mínima de 1 (uma) hora e máxima de 4 (quatro) horas. O candidato que se ausentar antes do prazo mínimo estipulado (1 hora) será eliminado do Processo Seletivo.
- Na Prova Escrita Objetiva, o preenchimento da Folha de Respostas será de inteira responsabilidade do candidato, que deverá proceder conforme as instruções deste Edital e do Fiscal.
- O candidato deverá preencher os alvéolos, na Folha de Respostas da Prova Escrita Objetiva, com caneta esferográfica transparente de tinta preta ou azul.
- Não serão computadas questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, emenda ou rasura, ainda que legível.
- Os prejuízos advindos de marcações feitas incorretamente na Folha de Respostas serão de inteira responsabilidade do candidato, não havendo substituição da Folha de Respostas por erro do candidato.
- O candidato, ao terminar a prova, entregará ao fiscal juntamente com a Folha de Respostas, o Caderno de Questões.

1. Em cães acometidos por malassezioze cutânea é incorreto afirmar:
 - a) Poder ser uma dermatite micótica primária
 - b) Pode apresentar-se regional ou generalizada
 - c) Geralmente ocorre associada a algumas doenças genéticas
 - d) A citologia e a dermatohistopatologia são métodos de diagnóstico
 - e) Para terapia pode-se utilizar xampu de sulfeto de selênio 2%

2. Assinale a alternativa falsa relacionada ao linfoma canino:
 - a) Possui etiologia desconhecida embora tenha sido associado a agentes químicos, campos eletromagnéticos ou aberrações cromossômicas
 - b) A localização no trato digestivo é a forma mais comumente observada
 - c) Animais com linfoma multicêntrico podem apresentar-se assintomáticos
 - d) A hipercalcemia é a uma síndrome paraneoplásica frequentemente relatada
 - e) A poliquimioterapia é a modalidade terapêutica mais utilizada

3. Os distúrbios mistos do equilíbrio acidobásico são compostos de dois ou mais processos patológicos que afetam o pH. Assinale a alternativa que exemplifica corretamente um quadro clínico que resulta em distúrbio misto do equilíbrio acidobásico:
 - a) vômito prolongado e pneumonia aspirativa: acidose metabólica e alcalose respiratória
 - b) insuficiência renal com vômito desproporcional: acidose metabólica e respiratória
 - c) insuficiência cardíaca com edema pulmonar grave: alcalose metabólica e respiratória
 - d) hipoadrenocorticism com vômito desproporcional: acidose e alcalose metabólica
 - e) todas estão incorretas

4. Muitas doenças sistêmicas, metabólicas e endócrinas têm efeitos reconhecidos sobre a função e a estrutura cardíaca, atuando de maneira direta ou indireta. Com base na citação acima, assinale a alternativa correta:
 - a) em cães com hipotireoidismo, a deficiência do hormônio tireoidiano ocasiona diminuição da contratilidade cardíaca, a qual não é revertida após a terapia de reposição hormonal
 - b) o hipercortisolismo desencadeia redução na frequência cardíaca
 - c) em gatos com hipertireoidismo, há aumento da taxa metabólica e do consumo de oxigênio, além da redução da resistência vascular periférica.
 - d) apenas “a” e “c” estão corretas
 - e) todas estão corretas

5. Ao detectar a anemia, laboratorialmente, é importante obter a contagem de reticulócitos. Pode-se dizer, de modo incorreto, para os mesmos:
 - a) São eritrócitos imaturos encontrados em pequeno número na circulação periférica de animais saudáveis
 - b) A contagem reticulocitária é útil para avaliar a resposta medular da anemia
 - c) Em felinos, os reticulócitos agregados tem vida média longa na circulação e se acumulam em grandes números
 - d) A contagem de reticulócitos pode ser feita por citometria de fluxo ou manualmente
 - e) O resultado da contagem é dado pela porcentagem de reticulócitos e pelo número de eritrócitos maduros restantes.

6. Podem ser citados como os antineoplásicos de maior potencial para irritação local e celulite necrotizante:
 - a) Vincristina, doxorrubicina e vimblastina
 - b) Actinomicina D, dacarbazina, vincristina
 - c) Vincristina, lomustina e clorambucil
 - d) “a” e “b” estão corretas
 - e) “a”, “b” e “c” estão corretas

7. Uma das principais causas de angustia respiratória felina é a asma. Em relação ao manejo emergencial é correto citar:
- Torna-se essencial a suplementação de oxigênio, administração de broncodilatadores e corticoides
 - A terbutalina comumente causa taquicardia
 - A aminofilina pode ser administrada seguramente em cardiopatas.
 - Somente “a” e “b” estão corretas
 - Todas estão corretas
8. Por definição, o termo piometra significa acúmulo de pus no lúmen uterino. É considerada uma doença do diestro, embora alguns animais em anestro possam apresentar a afecção. Em relação a tal patologia uterina é correto afirmar que:
- A hiperplasia endometrial cística invariavelmente progride para a piometra
 - Pode ocorrer em fêmeas jovens sob estímulo hormonal ou com ciclo estral irregular
 - Um dos diagnósticos diferenciais deve ser feito para as doenças que levam a poliúria e polidipsia
 - Aparentemente, a gravidade do quadro parece estar mais relacionada com a virulência do agente bacteriano do que com as dimensões do útero
 - Apenas “b”, “c” e “d” estão corretas
9. A hidrocefalia é definida como o acúmulo excessivo de líquido cefalorraquidiano (LCR) no interior ou exterior do sistema ventricular do encéfalo. Em relação a tal malformação não se pode afirmar:
- As raças braquicefálicas são umas das mais afetadas e a maioria apresenta sinais até um ano de idade.
 - A sintomatologia é variada, com alguns animais apresentando sintomas mínimos enquanto outros têm marcada disfunção neurológica
 - A radiografia simples poderá confirmar a presença de fontanelas persistentes
 - A ultrassonografia é útil na demonstração de aumento dos ventrículos em cães com abertura de fontanelas
 - Os diuréticos aumentam a reabsorção do LCR e os esteroides diminuem a produção do LCR
10. No tratamento tópico da acariase sarcóptica de felinos pode-se utilizar, sem risco de efeitos adversos:
- Fluralaner
 - Sulfeto de selênio
 - Benzoato de benzila
 - Apenas as alternativas “b” e “c” estão corretas
 - As alternativas “a”, “b” e “c” estão corretas
11. O hipertireoidismo felino é uma enfermidade crônica causada pela produção e secreção excessiva dos hormônios tiroxina e tri-iodotiroxina. No tocante a tal endocrinopatia é incorreto afirmar:
- Na patogenia há interação de fatores imunológicos, genéticos, ambientais, comportamentais e/ou dietéticos
 - A perda de peso e a polifagia devem-se ao aumento do gasto energético e do consumo de oxigênio
 - A dosagem sérica de T4 total é o melhor teste para executar a exploração funcional da tireoide
 - O tratamento medicamentoso com o metimazol é o de eleição por causa da alta eficácia e da relativa falta de complicações
 - A hipocalcemia é a complicação mais frequente no período pós-operatório imediato, quando é realizada a opção terapêutica de tireoidectomia bilateral

12. Em relação aos principais agentes intoxicantes no atendimento emergencial de animais de companhia é correto afirmar:
- Os principais efeitos dos carbamatos são neurológicos e musculares
 - Os principais efeitos dos piretroides são muscarínicos e nicotínicos
 - Gatos intoxicados com piretroides exibem movimentos rápidos das orelhas, tremores nas patas e contrações em músculos cutâneos superficiais.
 - O envenenamento secundário por rodenticidas anticoagulantes (isto é, um animal se intoxicaria ao ingerir um roedor morto pelo anticoagulante) é extremamente improvável na maioria dos casos
 - Apenas “c” e “d” estão corretas
13. Na infecção do trato urinário (ITU) de cães, pode-se afirmar de modo correto:
- É comum e pode ser classificada como simples, recorrente ou refratária
 - O *Enterococcus* sp. é a bactéria mais associada a ITU
 - As quinolonas são recomendadas como antimicrobianos de primeira escolha
 - Não é indicado o uso de acidificantes urinários
 - Apenas “a” e “d” estão corretas
14. Pacientes com diarreias crônicas são comuns na rotina da clínica de pequenos animais. O primeiro passo é definir se a diarreia é de intestino delgado ou grosso. Essa distinção pode ser feita por meio do histórico. Assim, conforme o tipo da diarreia, segundo a localização anatômica é correto afirmar que:
- Na diarreia de intestino delgado, o volume é normal ou pouco aumentado
 - Na diarreia de intestino grosso, é comum a hematoquezia e ausência de esteatorréia.
 - Na diarreia de intestino delgado, são usualmente verificados tenesmo e aspecto fecal variável
 - Na diarreia de intestino delgado, a presença de muco é frequente
 - Apenas “b” e “c” estão corretas.
15. Para os casos de orquite canina pode-se afirmar corretamente:
- quando de origem infecciosa, uma das possíveis vias de infecção corresponde ao movimento retrogrado dos microrganismos da próstata e do trato urinário inferior
 - a inflamação crônica resulta em degeneração testicular seguida de atrofia e fibrose
 - geralmente ocorre em animais idosos e com predisposição racial
 - apenas “a” e “b” estão corretas
 - todas estão corretas
16. As neoplasias gastrintestinais em cães apresentam particularidades clínicas, laboratoriais e anatomopatológicas que merecem destaque. Assinale a(s) questão(ões) correta(s) relacionada(s) às mesmas:
- As neoplasias de origem epitelial localizam-se principalmente no jejuno
 - Os linfonodos mesentéricos e o fígado são os principais alvos de metástase
 - Na hematologia normalmente é verificada anemia regenerativa.
 - O diagnóstico histológico mais frequente corresponde ao tumor estromal gastrointestinal, um tipo de sarcoma.
 - Todas estão corretas
17. No tratamento das ceratites ulcerativas, guardadas as particularidades de cada caso, obedecem-se aos seguintes critérios:
- Os inibidores de metaloproteinases, como a N-acetilcisteína, soro sanguíneo e EDTA, são raramente indicados, onde o EDTA tem se demonstrado o menos efetivo
 - O colírio de tropicamida constitui uma boa opção de midriático, pois tem efeito mais duradouro em relação à atropina

- c) A antibioticoterapia deve ser empregada, uma vez que a perda do epitélio favorece a adesão bacteriana
- d) Não se recomendam lentes de contato para a proteção corneal
- e) Todas estão corretas
18. A convulsão é o distúrbio neurológico mais comum na medicina de pequenos animais. Em geral, os clientes ficam perturbados emocionalmente pela natureza imprevisível e violenta das crises convulsivas. Com o tratamento apropriado, o paciente e o cliente pode geralmente manter uma boa qualidade de vida. Com base no texto acima se pode afirmar corretamente:
- a) A epilepsia secundária é a mais comum em cães
- b) A manifestação clínica é caracterizada apenas por crises convulsivas generalizadas
- c) Cães com epilepsia idiopática sofrem as primeiras crises convulsivas entre um e cinco anos de idade
- d) O tratamento é necessário ao longo de toda a vida do animal
- e) Todas estão corretas
19. Em relação à rinite fúngica em cães e gatos, é correto afirmar:
- a) É uma causa incomum de doença nasal
- b) O principal agente envolvido no cão é o *Aspergillus* spp. enquanto no gato é o *Cryptococcus neoformans*
- c) Infecções fúngicas induzem a proliferação granulomatosa que obstruem a cavidade nasal de gatos
- d) Na criptococose nasal o tratamento deve ser feito por um período médio de oito semanas
- e) Somente “b,” “c” e “d” estão corretas
20. A anemia hemolítica imunomediada (AHIM) caracteriza-se por uma reação imunológica tipo II que causa destruição dos eritrócitos, resultando em hemólise extravascular (80-90% dos casos) e, ocasionalmente, hemólise intravascular. No que diz respeito a tal doença imunomediada, é incorreto citar:
- a) Cadelas de meia idade são as mais afetadas
- b) O tempo de evolução normalmente é agudo
- c) Em torno de 1/3 dos casos de AHIM primária acometem a raça Cocker Spaniel
- d) A AHIM muitas vezes cursa com trombocitopenia imunomediada
- e) Aproximadamente 60-75% dos casos de AHIM em cães são secundários
21. Para a hiperplasia mamária felina, torna-se falso citar:
- a) Equivale a uma proliferação benigna não neoplásica dos ductos mamários e tecido conjuntivo periductal
- b) Normalmente é observada em gatas jovens com menos de dois anos de idade
- c) Não se sugere uma etiologia endócrina
- d) A alteração mais evidente é o crescimento rápido das glândulas mamárias
- e) O diagnóstico diferencial deve incluir neoplasias mamárias e mastite
22. A demodicidose canina é elencada como a dermatopatia mais prevalente, dentre aquelas de etiologia parasitária. Em relação ao diagnóstico laboratorial da mesma é coerente afirmar:
- a) a realização do exame parasitológico do raspado cutâneo é imprescindível para a obtenção do diagnóstico etiológico. Quando o ácaro é realmente presente, esse é evidenciado em praticamente 100% dos exames efetuados
- b) o exame parasitológico de pelame é indicado como parâmetro na manutenção ou suspensão da terapia
- c) nos casos de suspeita de pododemodicidose, quando há negatividade do exame parasitológico do raspado cutâneo, deve-se solicitar, como exames de eleição, o exame parasitológico de pelame e a impressão em fita de acetato

- d) apenas “a” e “c” estão corretas
e) todas estão corretas
23. Em relação à doença renal crônica é incorreto assinalar:
- a) uma das definições corresponde a “lesão renal existente por pelo menos três meses, com ou sem diminuição da taxa de filtração glomerular, na dependência do estágio”
 - b) em cães e gatos, o acometimento é independente da raça e da idade
 - c) a etiologia da anemia é multifatorial, sendo do tipo normocítica-normocrômica-arregenerativa
 - d) a hipocalemia é mais observada em cães, quando comparados aos gatos, devido à perda do eletrólito pela urina ou por diminuição da ingestão
 - e) nos estágios I e II os animais geralmente são assintomáticos
24. Na oncologia veterinária, as terapias alvo-específicas são definidas pelo uso de medicamentos que causam a morte das células neoplásicas pela interação com algum alvo específico presente nas células tumorais. Possui como um dos principais benefícios a seletividade em sua ação, podendo não atuar em células não neoplásicas. Os inibidores de tirosina quinase representam essa nova modalidade de quimioterapia antineoplásica. Em relação aos inibidores de tirosina quinase é correto afirmar:
- a) o mastocitoma é uma das suas principais indicações
 - b) não devem ser utilizados como primeira opção para todos os casos
 - c) como possuem ação seletiva, são isentos de efeitos colaterais
 - d) apenas “a” e “b” estão corretas
 - e) todas as alternativas acima estão corretas
25. O coronavírus felino (FCoV) é um vírus RNA envelopado que ocorre sob uma grande diversidade de amostras, classificáveis em dois patótipos: coronavírus entérico (FECV) e vírus da peritonite infecciosa felina (FIPV). Em relação ao FCoV, é correto assinalar:
- a) a eliminação do FECV pode ser transitória, recorrente ou crônica, durante meses ou anos
 - b) o FCoV é resistente à maioria dos detergentes e desinfetantes de uso doméstico
 - c) os gatos infectados pelo FECV apresentam na maioria das vezes, infecções inaparentes, mas usualmente o FECV é fatal
 - d) o exame sorológico é capaz de diferenciar os patótipos FECV e FIPV, além de possibilitar o estabelecimento de uma boa correlação entre os títulos de anticorpos e a doença
 - e) todas estão corretas
26. Sobre os Princípios e Diretrizes do Sistema Único de Saúde, marque a alternativa incorreta:
- a) Universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência.
 - b) Descentralização político-administrativa, com direção única no Ministério da Saúde para as três esferas de governo.
 - c) Igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie na assistência à saúde.
 - d) Direito à informação, às pessoas assistidas, sobre sua saúde.
 - e) Integralidade de assistência, entendida como um conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, em todos os níveis de complexidade do sistema.
27. Compreende um conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde:
- a) Vigilância em Saúde.
 - b) Vigilância Ambiental.
 - c) Vigilância Sanitária.
 - d) Vigilância Epidemiológica.

e) Vigilância em Saúde do Trabalhador.

28. Sobre os dados e informações que alimentam o Sistema de Vigilância Epidemiológica:

I Dados demográficos.

II Dados socioeconômicos.

III Dados ambientais.

IV Dados de morbidade e mortalidade.

V Notificação de surtos e epidemias.

Está(ão) correta(s):

a) Apenas III, IV e V.

b) Apenas I, II, III, IV.

c) Apenas IV e V.

d) Apenas IV.

e) I, II, III, IV e V.

29. Dentre os critérios aplicados no processo de seleção para notificação compulsória de doenças está a Transcendência. Marque a alternativa abaixo que não compreende o critério de Transcendência:

a) Magnitude.

b) Relevância social.

c) Relevância econômica

d) Severidade.

e) Estigmatização.

30. No Brasil, os eventos de saúde pública (ESP) são de notificação compulsória. São considerados eventos de saúde pública:

I Surto ou epidemia.

II Doença ou agravo de causa desconhecida.

III Alteração no padrão clínicoepidemiológico das doenças conhecidas.

IV Epizootias.

V Agravos decorrentes de desastres ou acidentes.

Estão corretas:

a) Apenas III, IV e V.

b) Apenas I, II, III, IV.

c) Apenas I, III e IV.

d) Apenas I e IV.

e) I, II, III, IV e V.