



**PROCESSO SELETIVO PARA RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL
E EM ÁREA PROFISSIONAL DA SAÚDE
EDITAL PROPPG UFERSA 58/2023**



PROVA ESCRITA OBJETIVA
CADERNO DE QUESTÕES

ÁREA: CLÍNICA MÉDICA DE PEQUENOS ANIMAIS

CANDIDATO	Nº INSCRIÇÃO

INSTRUÇÕES

- A prova terá duração mínima de 1 (uma) hora e máxima de 4 (quatro) horas. O candidato que se ausentar antes do prazo mínimo estipulado (1 hora) será eliminado do Processo Seletivo.
- Na Prova Escrita Objetiva, o preenchimento da Folha de Respostas será de inteira responsabilidade do candidato, que deverá proceder conforme as instruções deste Edital e do Fiscal.
- O candidato deverá preencher os alvéolos, na Folha de Respostas da Prova Escrita Objetiva, com caneta esferográfica transparente de tinta preta ou azul.
- Não serão computadas questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, emenda ou rasura, ainda que legível.
- Os prejuízos advindos de marcações feitas incorretamente na Folha de Respostas serão de inteira responsabilidade do candidato, não havendo substituição da Folha de Respostas por erro do candidato.
- O candidato, ao terminar a prova, entregará ao fiscal juntamente com a Folha de Respostas, o Caderno de Questões.

1) Em relação a demodicidose canina é correto afirmar:

- a) O exame parasitológico do pelo pode ser preconizado para o monitoramento da terapia
- b) Segundo sua distribuição é classificada como localizada ou generalizada
- c) A terapia com ivermectina causa frequentemente teratogenicidade em cadelas gestantes
- d) Apenas “a” e “c” estão corretas
- e) Todas estão corretas

2) Assinale a alternativa correta relacionada ao melanoma oral canino:

- a) Além da cirurgia, a radioterapia e a imunoterapia representam estratégias terapêuticas
- b) A localização preferencial é a junção cutânea-labial, em decorrência da exposição solar
- c) Durante o estadiamento clínico do melanoma oral, o exame citológico dos linfonodos regionais é indicado apenas se estiverem aumentados de volume
- d) Apenas “b” e “c” estão corretas
- e) Todas estão corretas

3) Dentre os distúrbios acido-básicos metabólicos, a acidose metabólica é o mais comumente diagnosticado nos pequenos animais. Assinale a alternativa que exemplifica corretamente a sua causa:

- a) Vômitos e lavagem gástrica
- b) Hiperaldosteronismo primário e hiperadrenocorticismismo canino
- c) Cetoacidose diabética, hipoadrenocorticismismo.
- d) Uso de diuréticos e hipoalbuminemia
- e) Apenas “b” e “d” estão corretas

4) A cardiomiopatia dilatada em cães é caracterizada por contratilidade reduzida e dilatação ventricular, envolvendo o ventrículo esquerdo ou ambos. Assinale a alternativa correta:

- a) A maior prevalência é observada em caninos machos
- b) A *Ehrlichia canis* pode causar miocardite ao deflagar a síndrome da resposta inflamatória sistêmica
- c) Deficiências nutricionais de taurina e L-carnitina são relacionadas com a etiologia
- d) Apenas “a” e “c” estão corretas
- e) Apenas “a”, “b” e “c” estão corretas

5) Em relação as anemias arregenerativas, é incorreto afirmar:

- a. São causadas por diminuição dos fatores da eritropoiese ou alteração no microambiente medular
- b. A anemia da doença renal e a deficiência de cobalamina é ácido fólico são exemplos
- c. Pacientes com anemia ferropriva devem ter o ferro repostado apenas por via oral
- d. As anemias hemolíticas pode ter relação com defeitos eritrocitários hereditários em cães e gatos
- e. Todas estão incorretas

6) Pode-se afirmar, de modo correto, para as síndromes paraneoplásicas (SPN), em cães e gatos:

- a) Em felinos, a alopecia é um achado comum relacionado timoma,
- b) O único grupo de substâncias humorais relacionadas a SPN é representado pelas de origem eutópica
- c) A eritrocitose pode ser observada em casos de tumor venéreo transmissível
- d) Apenas “a” e “b” estão corretas
- e) Apenas “a” e “c” estão corretas

7) Para as doenças do trato respiratório posterior dos gatos, é correto afirmar:

- a) Podem ser definidas como infecciosas e não infecciosas
- b) O gato é a única espécie animal que tem “síndrome asma” similar aos humanos
- c) A tosse pode ser confundida com vômito ou regurgitação pelos tutores
- d) Pode ser realizada a associação de broncodilatadores, como a terbutalina e o salbutamol
- e) Todas estão corretas

8) Em relação as afecções do sistema genital da espécie canina, é correto afirmar:

- a) As alterações em vulva e vagina são incomuns na rotina clínica
- b) A azotemia pré-renal geralmente está associada a quadros mais graves de piometra
- c) A presença de cistos prostáticos é observada geralmente em conjunto com o seminoma

- d) Apenas “a “e “c” estão corretas
- e) Todas estão corretas

9) Em relação as meningoencefalites granulomatosas do sistema nervoso central, pode-se afirmar corretamente:

- a) Apresenta início abrupto e progressivo e possui três apresentações clínicas (disseminada, focal e ocular)
- b) Frequentemente é relatada em gatos, além da espécie canina
- c) Glicocorticoides e ciclosporina são exemplos de opções de terapia
- d) Apenas “a “e “c” estão corretas
- e) Todas estão corretas

10) Torna-se correto afirmar para a dermatofitose em cães e gatos:

- a) A colonização do dermatófito pode iniciar-se pelas unhas
- b) Não é provável a relação com fator genético (imunidade específica ao dermatófito)
- c) Principalmente em cães da raça Dachshund, o quadro pode apresentar-se por alopecia generalizada e crostas melicéricas
- d) Apenas “b” e “c” estão corretas
- e) Apenas “b” está correta

11) No tocante ao diagnóstico do hipotireoidismo canino é incorreto afirmar:

- a. A anormalidade bioquímica mais comum é a hipercolesterolemia
- b. A anemia regenerativa é um dos achados laboratoriais nos exames de triagem
- c. A mensuração do T4 livre reflete melhor a função da glândula tireoide
- d. A dosagem da frutossamina pode ser útil no rastreamento do hipotireoidismo em pacientes não diabéticos
- e. Doenças não tireoidianas, uso de corticoides e anticonvulsivantes causam interferência na dosagem hormonal

12) Em relação as emergências em cães e gatos, assinale a alternativa correta:

- a) No auxílio ao diagnóstico da intoxicação por monóxido de carbono, o uso da oximetria é essencial
- b) Fluidoterapia, reposição de sódio e insulino-terapia são essenciais na abordagem do paciente em cetoacidose diabética
- c) Rupturas de bexiga secundárias a obstrução uretral são acompanhadas de acidose metabólica
- d) Apenas “a” e “b” estão corretas
- e) Todas estão corretas

13) Na infecção do trato urinário de cães e gatos, pode-se afirmar de modo correto:

- a) A padrofloxacina é uma boa opção para pielonefrite, sobretudo em gatos
- b) Há correlação entre a bacteriúria subclínica e o desenvolvimento de cistite
- c) A cistite bacteriana esporádica em geral é relacionada a alterações anatômicas e funcionais
- d) Apenas “b” e “c” estão corretas
- e) Todas estão corretas

14) As diarreias de início abrupto e com duração até 7 dias podem ser classificadas como agudas. Para esses casos, é correto afirmar:

- a) Na maioria dos casos não é necessária a realização de testes de diagnóstico
- b) A terapêutica, em geral, é sintomática
- c) Intolerâncias dietéticas, reações medicamentosas e toxinas podem ser causas comuns
- d) Apenas “b” e “c” estão corretas
- e) Todas estão corretas

15) Para as doenças prostáticas do cão pode-se afirmar corretamente:

- a) A prostatite geralmente é decorrente de infecção por via hematogena
- b) Na hiperplasia prostática benigna, o tenesmo e a hematúria podem ser manifestações clínicas
- c) A finasterida e o aglepristone são opções para a terapia clínica da hiperplasia prostática benigna
- d) Apenas “a” e “c” estão corretas
- e) Todas estão corretas

16) Dentre as neoplasias malignas de origem hematopoiética, o linfoma é o mais comum. Assinale a alternativa incorreta:

- a) Poliúria e polidipsia não são achados clínicos em cães com linfoma
- b) Em cães, a forma anatômica mais comum é a multicêntrica
- c) O linfoma cutâneo pode ser classificado, histologicamente, como epiteliotrópico e não epiteliotrópico.
- c) A anemia e a hipercalcemia são síndromes paraneoplásicas comuns
- d) O linfoma é a neoplasia mais frequente no intestino dos gatos
- e) A maioria dos gatos com linfoma mediastinal são jovens e positivos para o vírus da leucemia felina

17) Em relação as conjuntivites na espécie felina, é falso afirmar:

- a) Geralmente decorre de causas específicas primárias, como as infecciosas
- b) O herpesvírus felino tipo 1 é a causa infecciosa mais comum
- c) As conjuntivites herpéticas podem estar associadas a manifestações clínicas sistêmicas
- d) O calicivírus é também uma causa infecciosa e encontra-se relacionado com o fenômeno de latência
- e) A conjuntivite herpética neonatal é de alta morbidade

18) Para o tratamento da epilepsia em cães e gatos deve-se considerar erroneamente:

- a) Não julgar a eficácia de um medicamento por pelo menos duas semanas de uso
- b) Em gatos, recomenda-se monitorar a concentração de fenobarbital mais frequentemente do que o recomendado para cães
- c) A gravidade dos quadros convulsivos em gatos é um indicativo de tratamento malsucedido
- d) A terapia com brometo de potássio deverá ser iniciada em cães com epilepsia refratária
- e) Em cães, o diazepam não é efetivo como anticonvulsivante oral pela meia vida curta e desenvolvimento de tolerância

19) Em relação as enfermidades da cavidade nasal deve-se pontuar como verdadeiro:

- a) A maioria das neoplasias nasais são malignas, com alta ocorrência de metástases
- b) Halitose e esternutações são exemplos de manifestações clínicas relatadas
- c) Em gatos, a dispneia expiratória é o principal efeito da obstrução por pólipos nasofaríngeos
- d) A rinite fúngica é incomum em cães
- e) A rinite bacteriana primária é comum em gatos

20) No que diz respeito as coagulopatias, é incorreto citar:

- a) O hemangiossarcoma pode ser uma condição associada a coagulação intravascular disseminada
- b) A rivaroxabana é um fármaco indicado na profilaxia da trombose venosa
- c) O tempo de coagulação ou tempo de coagulação ativada são testes de triagem para o diagnóstico laboratorial das coagulopatias
- d) O encurtamento dos tempos de coagulação tem significado clínico e sugere estados de hipercoagulabilidade
- e) A tromboembolia pulmonar é uma das manifestações mais comuns nos estados de hipercoagulabilidade

21) Em relação a vaginite canina, é correto afirmar:

- a) Pode acometer fêmeas ovário-histerectomizadas ou não
- b) Ao exame físico, podem ser observadas vesículas e hipertrofia dos folículos linfóides
- c) Se o animal estiver próximo ao estro, pode-se acompanhar a evolução da doença, ao adotar a conduta expectante
- d) O uso de cremes contendo estrogênio pode ser recomendado no tratamento de vaginites
- e) Todas estão corretas

22) Para a criptococose canina e felina, é incoerente afirmar:

- a) Em gatos, o comprometimento mais frequente é o respiratório
- b) Podem ser observados sintomas neurológicos e oculares
- c) É uma enfermidade com potencial de risco, em termos de saúde pública
- d) Provas sorológicas são disponíveis para o diagnóstico
- e) O fluconazol é indicado para os casos de comprometimento do sistema nervoso central

23) Em relação à doença renal crônica felina é correto assinalar:

- a) Os distúrbios do metabolismo ósseo mineral não é fator prognóstico
- b) A diabetes *mellitus* é um exemplo de doença metabólica associada ao desenvolvimento da doença
- c) A cisplatina é um exemplo de fármaco com baixo potencial nefrotóxico
- d) Dieta com altos teores de potássio pode ser fator de risco
- e) Todas estão corretas

24) Para o mastocitoma cutâneo canino é falso afirmar:

- a) Quando localizados em pele escrotal tende-se a possuir um prognóstico favorável
- b) A mutação do gen *c-Kit* é considerado como um fator para o prognóstico
- c) Raças que tem o fator de risco aumentado correspondem ao Pug e Bulldog inglês
- d) A remissão completa com o quimioterápico lomustina é baixa (6% aproximadamente)
- e) A neoplasia quando palpada pode resultar na degranulação de amíbas vasoativas, sendo esse fenômeno denominado com sinal de *Darier*

25) Em relação a peritonite infecciosa felina, assinale a alternativa correta:

- a) A imunofluorescência de biopsias intestinais ainda não é um teste indicado para o diagnóstico
- b) Resultados negativos do teste de Rivalta podem ocorrer em gatos com peritonite bacteriana
- c) Trombocitose é um achado laboratorial comum, em virtude da coagulação intravascular disseminada
- d) Gatos com adequada resposta imune celular podem recuperar-se ou apresentar infecção subclínica
- e) Todas estão corretas

26) São objetivos do Sistema Único de Saúde (SUS), exceto:

- a) A identificação dos fatores condicionantes e determinantes da saúde.
- b) A divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da saúde.
- c) A formulação de política de saúde destinada a promover ações nos campos econômico e social.
- d) A assistência às pessoas por intermédio de ações exclusivas de promoção e proteção da saúde.
- e) A assistência às pessoas com a realização integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas.

27) Sobre os campos de atuação da Vigilância no Sistema Único de Saúde (SUS), é correto afirmar:

- a) Entende-se por vigilância ambiental um conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde.
- b) Entende-se por vigilância epidemiológica um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos.
- c) As ações de vigilância epidemiológica abrangem o controle de bens de consumo que, direta ou indiretamente, se relacionem com a saúde, compreendidas todas as etapas e processos, da produção ao consumo.
- d) As ações de vigilância sanitária abrangem o controle da prestação de serviços que se relacionam somente diretamente com a saúde.
- e) A vigilância sanitária constitui-se no conjunto de ações e serviços que proporcionam o conhecimento e a detecção de fatores de risco do meio ambiente que interferem na saúde humana.

28) Sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) é incorreto afirmar:

- a) A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada cinco anos com a representação dos vários segmentos sociais.
- b) A Conferência de Saúde objetiva avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes.

c) O Conselho de Saúde, em caráter permanente e deliberativo, é órgão colegiado composto por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários.

d) O Conselho de Saúde atua na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde na instância correspondente.

e) A representação dos usuários nos Conselhos de Saúde e Conferências será paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos.

29) Sobre a ocorrência coletiva de determinada doença é correto afirmar:

a) O termo epidemia refere-se à doença habitualmente presente entre os membros de determinado grupo, numa determinada área e mantendo sua incidência constante.

b) Endemia é uma alteração, espacial e cronologicamente delimitada, do estado de saúde-doença de uma população, caracterizada por uma elevação progressivamente crescente, inesperada e descontrolada dos coeficientes de incidência de determinada doença ou agravo.

c) Na endemia não são permitidas as flutuações de valores da incidência, tais como as variações sazonais.

d) Dentre os mecanismos desencadeantes das epidemias está a exportação de casos alóctones para a população de suscetíveis.

e) Dá-se o nome de Pandemia à ocorrência epidêmica caracterizada por larga distribuição espacial, atingindo várias nações.

30) A epidemiologia é o instrumento privilegiado que compreende a observação exata, a interpretação correta, a explicação racional e a sistematização científica dos eventos de saúde-doença em nível coletivo, orientando, portanto, as ações de intervenção do Médico Veterinário, como na prevenção de doenças, prolongamento da vida e desenvolvimento da saúde. Nesta perspectiva, sobre prevenção é incorreto afirmar:

a) A prevenção pode ser feita nos períodos de pré-patogênese e patogênese.

b) A prevenção primária se faz com a intercepção dos fatores pré-patogênicos, inclui promoção da saúde, proteção específica e diagnóstica precoce.

c) A proteção específica inclui imunização e uso de repelentes contra os vetores.

d) A prevenção secundária é realizada sob a ação do agente patogênico, inclui diagnóstico precoce, tratamento imediato e limitação da incapacidade.

e) A prevenção terciária inclui a reabilitação.