



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO  
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO  
COMISSÃO DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL E EM ÁREA PROFISSIONAL DA SAÚDE -COREMU  
PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM ÁREA PROFISSIONAL DA SAÚDE EM MEDICINA VETERINÁRIA

**Edital nº: 23/2017 PROPPG/UFERSA**

**Clínica e Cirurgia de Grandes Animais**

1. São sinais clínicos de intoxicação por ingestão da planta tóxica *Palicourea marcgra vii*:

- a) fotossensibilização e morte súbita.
- b) incoordenação, tremores musculares e da pele, tetania e fotossensibilização.
- c) hematúria intermitente, anemia, emagrecimento e incontinência urinária.
- d) relaxamento da mandíbula e torção da cabeça durante a mastigação e ruminação.
- e) arritmia cardíaca, paraplegia, andar cambaleante, dispneia e prostração e morte súbita

2. Considerando um bezerro apresentando diarreia neonatal, com sinais clínicos de desidratação de 10%, qual a reposição hidroeletrolítica mais indicada?

- a) Fluidoterapia com solução de glicose a 5% acrescido de glicose por via oral.
- b) Fluidoterapia com solução de glicose a 5% acrescido de glicose por via intravenosa.
- c) Fluidoterapia com solução de NaCl 0,9%, acrescido de glicose por via intravenosa.
- d) Fluidoterapia com solução de ringer com lactato, acrescido de bicarbonato de sódio e de glicose por via oral.
- e) Fluidoterapia com solução de ringer com lactato, acrescido de bicarbonato de sódio e de glicose por via intravenosa.

3. Problemas de casco em bovinos estão relacionados a perdas de produtividade com baixa produção leiteira, diminuição do peso corporal, baixo desempenho reprodutivo, tratamento dos animais doentes e descarte. Das afecções podais em bovinos, é correto afirmar que

a) erosão de talão é definida como uma massa dura formada pela reação da pele do espaço interdigital e ou do tecido subcutâneo e tem como principal causa a penetração de corpo estranho, ou de qualquer outro material contaminado no “casco”.

b) a laminite é definida como um processo inflamatório agudo ou crônico das estruturas sensíveis do casco, que resulta em claudicação e deformidades do casco e está relacionada com distúrbios nutricionais.

c) o tratamento da úlcera de sola consiste apenas na limpeza com água e sabão e casqueamento corretivo.

d) a dermatite interdigital é caracterizada por uma hiperplasia da pele e tecido subcutâneo da região interdigital.

e) a prevenção de doenças podais envolve apenas o uso regular de pedilúvio com formol a 5%.

4. Qual das etiopatogenias da síndrome cólica equina apresenta tratamento clínico, podendo evoluir ao cirúrgico?

a) Ruptura de Estômago.

b) Torção de cólon menor.

c) Torção de Intestino Delgado.

d) Compactação de Cólon Maior.

e) Hérnia Inguino-Escrotal Estrangulada.

5. A Instrução Normativa Ministerial Nº2 – 10/01/01, instituiu o Programa Nacional de Controle e Erradicação da Brucelose e Tuberculose. Entre as alternativas abaixo, assinale a que não condiz com as diretrizes determinadas pelo documento.

a) baixar a prevalência e a incidência de brucelose e tuberculose.

b) identificar e tratar os animais doentes.

c) minimizar o impacto da doença na pecuária e na população humana.

d) realizar Tuberculinização periódica e Sacrifício dos bovinos reagentes.

e) realizar credenciamento e capacitação de médicos Veterinários.

6. Marque a afirmativa INCORRETA sobre a coccidiose:

- a) Animais adultos infectados, clinicamente sadios, em geral, são fontes de infecção para jovens suscetíveis.
- b) Animais mais velhos geralmente são resistentes à doença clínica, porém podem apresentar infecções esporádicas não aparentes.
- c) Ciclo de vida da Eimeria é considerado autolimitante e terminará espontaneamente dentro de algumas semanas, caso não ocorra uma reinfecção.
- d) Animais infectados podem apresentar diarreia.
- e) O tratamento de eleição é com vermífugos a base de ivermectinas.

7. É considerado um dos principais fatores de risco de urolitíase em pequenos ruminantes

- a) descamação de células da mucosa da bexiga que formam os núcleos orgânicos dos cálculos.
- b) elevada quantidade de cálcio nos concentrados.
- c) elevada quantidade de magnésio nos concentrados.
- d) elevada quantidade de fósforo no concentrado e desequilíbrio Ca:P.
- e) produção de saliva abaixo do normal nos animais com concentrados na dieta

8. Todas as alternativas abaixo estão corretas, EXCETO:

- a) *Palicourea marcgravii*, *Mascagnia rígida* e *Ateleia glazioviana* e são plantas cardiotoxícas.
- b) *Amaranthus spp*, *Thiloa glaucocarpa* e *Tephrosia cinerea* são plantas nefrotóxicas.
- c) *Cestrum laevigatum*, *Crotalaria spp*, *Brachiaria spp* e *Enterolobium spp* são plantas hepatotóxicas.
- d) A intoxicação por *Solanum fastigiatum*, *Ipomoea asarifoliae* *Prosopis juliflora* causam sintomatologia nervosa.
- e) *Sorghum spp.*, *Manihot spp.* são plantas cianogênicas.

9. Em relação a polioencefalomalácia todas as afirmativas são corretas, EXCETO:

- a) Deve ser tratada com vitamina B1 na dose de 10 mg por kg de peso vivo a cada 6 horas. O uso de diuréticos e antiinflamatórios também é indicado.
- b) Pode acometer bovinos, ovinos e caprinos.
- c) Ocorre em diversas doenças incluindo deficiência de vitamina B1, intoxicação por cloreto de sódio, intoxicação por chumbo, encefalite por herpesvírus bovino-5 e intoxicação por enxofre.
- d) Fazem parte dos sinais clínicos da enfermidade cegueira total ou parcial, opistótono, pressão da cabeça, nistagmo e estrabismo.
- e) Histologicamente caracteriza-se por necrose laminar do córtex cerebral e microabcesdações no tronco encefálico.

10. Qual dos protocolos terapêuticos abaixo pode ser utilizado na fase inicial da laminite?

- a) fluidoterapia hidroeletrolítica acidificante, antiálgicos e antiinflamatórios esteroidais.
- b) fluidoterapia hidroeletrolítica acidificante, antiálgicos e antiinflamatórios esteroidais, bloqueadores, alfa-adrenérgicos.
- c) fluidoterapia hidroeletrolítica com lactato de sódio, duchas e pedilúvio frios, anticoagulantes como a heparina, bloqueadores, alfa-adrenérgicos como a acepromazina, antiálgicos e antiinflamatórios não esteróides, curtos períodos de locomoção lenta.
- d) fluidoterapia hidroeletrolítica acidificante, antiálgicos e antiinflamatórios não esteróides, curtos períodos de locomoção lenta.
- e) fluidoterapia hidroeletrolítica com lactato de sódio, duchas e pedilúvio frios, antiálgicos e antiinflamatórios esteroidais.

11. Marque a alternativa correta em relação a tristeza parasitária bovina:

- a) A Babesia bigemina pode desencadear o quadro clínico conhecido como babesiose cerebral.
- b) A mortalidade é menor em adultos infectados pela primeira vez.
- c) Nas áreas de instabilidade enzoótica deve-se evitar a infestação com carrapatos para garantir a imunidade.
- d) Animais recém introduzidos em uma região endêmica são mais resistentes à enfermidade.

e) Nas áreas de instabilidade enzoótica os surtos geralmente ocorrem quando os bovinos voltam a ter contato com carrapatos após reduções temporárias da infestação

12. As alternativas abaixo sobre a toxemia da prenhez estão corretas, EXCETO:

- a) A lesão histológica observada no fígado é uma marcada degeneração gordurosa.
- b) Dentre os sinais clínicos temos marcada sintomatologia nervosa
- c) Acomete ovinos e caprinos no terço final da gestação
- d) É uma enfermidade com baixa taxa de mortalidade
- e) Ocorre devido a uma desordem no metabolismo energético dos animais e aumento das necessidades de glicose

13. Com relação a uma ferida que apresenta características de habronemose, deve se proceder da seguinte forma:

- a) Retirada cirúrgica da lesão, dermorrafia, biopsia.
- b) Cauterização, tratamento tópico, cultura bacteriana.
- c) Biopsia, retirada cirúrgica da lesão, tratamento parental.
- d) Retirada cirúrgica da lesão, biopsia, tratamento parental/tópico.
- e) Cauterização, tratamento tópico, biopsia

14. Nos casos de laparotomia exploratória em equinos com cólica, com acúmulo de gás nas vísceras, os passos a serem seguidos, após a abertura da cavidade abdominal são:

- a) Aspiração do gás acumulado no interior das vísceras, exploração meticulosa dos órgãos cavitários, resolução do problema e miiorrafia.
- b) Exploração meticulosa dos órgãos cavitários, resolução do problema e miiorrafia.
- c) Secção dos órgãos com acúmulo de conteúdo sólido, esvaziamento destes órgãos e miiorrafia.
- d) Exposição do segmento intestinal acometido, resolução do problema e miiorrafia.
- e) Colocação de dreno nas vísceras.

15. Sinais clínicos de mastite aguda causada por microorganismos gram-negativos incluem todos os abaixo citados, exceto:

- a) Anorexia
- b) Estase rumenal
- c) Bradicardia
- d) Edema de glândula mamária
- e) Febre maior que 40,5°C

16. A desmotomia do ligamento frenador carpiano superior ou “check superior” pode ser indicada em qual das afecções do aparelho locomotor de equinos?

- a) Fratura de metacárpico acessório.
- b) Tendinite recidiva do flexor digital profundo.
- c) Tendinite recidiva do flexor digital superficial.
- d) Desmite recidiva do suspensório do boleto.
- e) Deformidade flexural do flexor digital profundo.

17) Bovinos acometidos por obstrução uretral juntamente com sinais de edema subcutâneo e celulite, apontam que uma ruptura uretral já tenha ocorrida. O acúmulo de urina nos tecidos subcutâneos acarreta alta resposta inflamatória que resultará numa pele friável, na região abdominal ventral. Após realizar penectomia e fixação do coto peniano à pele, recomenda-se que o cirurgião realize incisões longitudinais paralelas, lateralmente ao prepúcio, evitando traumas nas veias abdominais subcutâneas.

Esta conduta cirúrgica objetiva:

- a) Promover cicatrização secundária
- b) Diminuir a infecção
- c) Evitar recidivas
- d) Facilitar a drenagem
- e) Formar tecido de granulação

18) O ACESSO CIRÚRGICO indicado para na resolução de dilatação e ou torção do ceco em vacas é:

- a) Paralombar esquerdo
- b) Paramediano ventral

- c) Mediano ventral pré-retroumbilical
- d) Pré-retroumbilical
- e) Paralombar direito

19) Indigestão vaginal, relacionada à lesão de ramos do nervo vago pode ser devido às causas que se seguem, EXCETO:

- a) Edema de peito e barbela
- b) Aderências pós-complicações à reticuloperitonite
- c) reticuloperitonite
- d) Pleurisia
- e) Após correção cirúrgica abomasal

20) Apesar da etiologia precisa dos Deslocamentos abomasais à esquerda (DAE) ser de origem desconhecida, há fatores de ordem primária, que etiologicamente podem predispor à enfermidade, dentre os que se seguem EXCETUA-SE:

- a) Parto laborioso
- b) Fator que resulta em atonia ou hipomotilidade abomasal
- c) Dieta rica em fibras e pobre em carboidratos
- d) Prenhez (fator mecânico)
- e) Acúmulo de gases e alteração da motilidade abomasal

21) A resolução de laceração perineal grau 3 em éguas poderá ser realizado através da técnica:

- a) Caslick
- b) Mayo
- c) Utrech
- d) Aanes
- e) Halsted

22) A fixação dorsal de patela é uma desordem funcional da articulação fêmuro-tíbio-patelar que acomete frequentemente equídeos e ruminantes de grande porte, impedindo a movimentação temporária, normal ou

permanente, da articulação. A manifestação de dor é devida à hiperextensão dos ligamentos patelar, medial e intermédio, desestabilizando a articulação.

A enfermidade se estabelece quando.... e; seu tratamento, respectivamente são:

- a) O ligamento patelar medial prende-se sobre o côndilo lateral do fêmur; tenotomia do tendão patelar medial
- b) O ligamento patelar medial prende-se sobre o côndilo medial do fêmur; desmotomia ligamentar patelar medial
- c) Ocorre ruptura do ligamento patelar lateral; desmotomia patelar medial
- d) Ocorre ruptura do ligamento sartório; tenotomia do tendão patelar medial
- e) Ocorre luxação fêmur-tíbio-pateelar; artrodese

23)As causas predisponentes mais prováveis da fixação dorsal de patela, em equinos, são a deficiência nutricional, o tipo de trabalho, topografia acidentada do ambiente criatório, hereditariedade e traumatismos (FERREIRA et al., 1991).

Assinale a alternativa CORRETA de causa primária (TAEC, 2003) à luxação patelar medial em equídeos.

- a) Fator congênito
- b) Flacidez ligamentar
- c) Fator Anatômico
- d) Fator hormonal
- e) Fator Idade

24)Em equinos, a retroflexão caudal do ceco deve ser lembrada para diagnóstico diferencial com a rotação de ceco. Na rotação do ceco o ponto de constrição situa-se geralmente em sua base. Esta patologia é rara e leva à obstrução e necrose do segmento rotacionado.

Considerando que os sintomas são análogos aos de uma obstrução de intestino delgado, a ESTRUTURA que pode estar envolvida é:



- a) íleus
- b) intestino delgado
- c) cólon menor
- d) cólon dorsal direito
- e) íleo

25) Dois tipos principais de encarceramentos intestinais são diagnosticados em eqüinos, no forame epiplóico e no ligamento nefroesplênico. Os encarceramentos adquiridos estão associados com invaginações fisiológicas provocadas por hiperperistaltismos; e ocorrem DEVIDO:

- a) Obstruções por corpos estranhos
- b) Hipotonia peristáltica da alça intestinal envolvida
- c) Acentuada infestação por *Strongylus equi*
- d) Intussuscepções
- e) Lacerações ou rupturas espontâneas do mesentério

26) Ao Sistema Único de Saúde (SUS) compete:

I – controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde e participar da produção de medicamentos e equipamentos.

II – participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento básico.

III – incrementar, seja em sua área de atuação ou não, o desenvolvimento científico e tecnológico.

IV – fiscalizar e inspecionar alimentos, nos seus aspectos sanitários, todavia o controle de seu teor nutricional fica a cargo dos órgãos de defesa do consumidor.

V – colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho.

Estão corretas:

- a) I, III e IV.
- b) I, II e V.
- c) II, III e V.
- d) I, II, III e V.
- e) I, II, III, IV e V.

27) De acordo com o Sistema Único de Saúde (SUS), o direito ao acesso aos serviços de saúde, em todos os níveis de atenção, refere-se ao princípio da:

- a) Integralidade.
- b) Igualdade.

- c) Universalidade.
- d) Equidade.
- e) Imprescindibilidade.

28) A Vigilância em Saúde articula os vários níveis de prevenção e os vários níveis de organização da atenção à saúde. Neste sentido, sobre o seu campo de abrangência é correto afirmar:

- a) Vigilância Sanitária compreende um conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente.
- b) Vigilância Ambiental é o conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos.
- c) Vigilância em Saúde do Trabalhador abrange o controle da prestação de serviços que se relacionam direta ou indiretamente com a saúde.
- d) Vigilância Ambiental é o conjunto de ações que abrange o controle de bens de consumo que direta ou indiretamente se relacionem com a saúde.
- e) A Vigilância Epidemiológica tem como foco a saúde individual e objetiva recomendar medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos, assim como registrar e divulgar a descentralização dos serviços para os municípios.

29) Em Vigilância Epidemiológica, são muito utilizados os conceitos de Inquérito e Levantamento, a seguir marque a alternativa incorreta:

- a) Inquérito epidemiológico trata-se de um estudo seccional com uma amostra de indivíduos, estatisticamente representativos do total, escolhidos de maneira aleatória.
- b) O inquérito epidemiológico é utilizado quando as informações existentes são inadequadas ou insuficientes.
- c) Levantamento epidemiológico é um estudo realizado com base em dados existentes nos registros dos serviços de saúde ou de outras instituições.
- d) Levantamento epidemiológico é um estudo amostral e destina-se a coletar dados para complementar a informação já existente.
- e) A recuperação de séries históricas, para análise de tendências, e a busca ativa de casos, para aferir a eficiência do sistema de notificação, são exemplos de levantamentos epidemiológicos.

30) No que diz respeito a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde, marque a opção incorreta.

- a) O Conselho de Saúde é um órgão colegiado composto por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários que atua na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde.
- b) A representação dos usuários do SUS nos Conselhos e Conferências de Saúde será paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos.
- c) O Conselho de Saúde pode atuar nos aspectos econômicos e financeiros na instância correspondente do SUS, em cada esfera do governo.

- d) Dentre a formulação de estratégias e o controle da execução da política de saúde por parte do Conselho de Saúde, está o estabelecimento de consórcio para execução de ações e serviços de saúde, remanejando, entre si, parcelas de recursos previstos na legislação.
- e) A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada dois anos com a representação dos vários segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes.