



**PROCESSO SELETIVO PARA RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL
E EM ÁREA PROFISSIONAL DA SAÚDE
EDITAL PROPPG UFERSA 32/2018**



PROVA ESCRITA OBJETIVA - 14/12/2018
CADERNO DE QUESTÕES

ÁREA: CLÍNICA CIRÚRGICA DE ANIMAIS DE COMPANHIA

CANDIDATO	Nº INSCRIÇÃO

INSTRUÇÕES

- A prova terá duração mínima de 1 (uma) hora e máxima de 4 (quatro) horas. O candidato que se ausentar antes do prazo mínimo estipulado (1 hora) será eliminado do Processo Seletivo.
- Na Prova Escrita Objetiva, o preenchimento da Folha de Respostas será de inteira responsabilidade do candidato, que deverá proceder conforme as instruções deste Edital e do Fiscal.
- O candidato deverá preencher os alvéolos, na Folha de Respostas da Prova Escrita Objetiva, com caneta esferográfica transparente de tinta preta ou azul.
- Não serão computadas questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, emenda ou rasura, ainda que legível.
- Os prejuízos advindos de marcações feitas incorretamente na Folha de Respostas serão de inteira responsabilidade do candidato, não havendo substituição da Folha de Respostas por erro do candidato.
- O candidato, ao terminar a prova, entregará ao fiscal juntamente com a Folha de Respostas, o Caderno de Questões.

01 - (Slatter, 2007) antimicrobianos são classificados por bacteriostáticos ou bactericidas, conforme a proporção entre a concentração bactericida mínima e a concentração inibitória mínima. A recomendação é que a dose de um antimicrobiano bactericida a ser usado tenha alcance em sua concentração plasmática de 4 a 8 vezes a concentração inibitória mínima para se obter a eficácia máxima do medicamento. São antibióticos cuja eficácia é dependente da concentração máxima:

- A) Aminoglicosídeos
- B) Beta lactâmicos
- C) Sulfas
- D) Cefalosporinas
- E) Fluorquinolonas

02 - (Slatter, 2007) A administração profilática de antibiótico (ex. cefazolina, 22mg.kg-1) tem por meta manter a concentração antimicrobiana no local da incisão cirúrgica durante todo o procedimento. Deve ser aplicado, por via intravenosa, 30 a 60 minutos antes do procedimento. Essa recomendação ocorre porque:

- A) A meia vida, ou clearance do antibiótico não possui eficiência necessária para manter a ferida cirúrgica no período trans-cirúrgico.
- B) Deve basear-se no conhecimento do comportamento farmacocinético do medicamento e no tempo de concentração inibitória do patógeno
- C) Estafilocóccias e E. coli são oportunistas nestas ocasiões
- D) A cada 90 minutos novas administrações adicionais profiláticas do antibiótico serão necessárias.
- E) Há um lapso entre a concentração sérica máxima e a encontrada no líquido da ferida

03 - Segundo (Slatter, 2007), a maioria das infecções que ocorrem nos procedimentos ortopédicos é causada por contaminação cutânea e está presente:

- A) Staphylococcus aureus
- B) Escherichia coli
- C) Proteus
- D) Staphylococcus spp
- E) Anaeróbios

04 - (Bojrab, 1991) O tratamento efetivo para resolução de mucocele salivar, em glândula salivar mandibular é a remoção das glândulas mandibular, sublingual monostomática, e do ducto salivar que as interliga. O principal suprimento sanguíneo da glândula salivar mandibular é feito:

- A) Artéria superficial profunda
- B) Ramos da artéria auricular maior
- C) Pelo ramo glandular da artéria facial
- D) Artéria linguofacial
- E) Artéria carótica interna

05 - (Slatter, 2007) Na anatomia cirúrgica, relacionada às enfermidades de glândulas salivares, as glândulas salivares que não estão presentes em cães, são:

- A) Mandibulares
- B) Molares
- C) Parótidas
- D) Zigomáticas
- E) Sublinguais

06 - (Denny; Butterworth, 2006) Na consolidação óssea são considerados a homeostasia do cálcio, do hormônio paratireóideo e o suporte sanguíneo ao osso injuriado. A velocidade de consolidação óssea em cães e gatos não pode ser influenciada por:

- A) Idade do paciente
- B) Tipo do osso envolvido
- C) Tipo de fratura
- D) Aumento do pH local
- E) Método de tratamento

07 - (Fossum, 2015) Em paciente canino que apresenta trauma contundente em membro torácico, em que não ocorreu luxação e não existem fraturas no membro, preconiza-se tratamento conservador. A técnica de coaptação externa apropriada ao paciente é:

- A) Muleta modificada de Thomas
- B) Bandagem no tronco
- C) Bandagem de Robert Jones
- D) Tipóia de Valpeau
- E) Tipóia de Ehmer

08 - (Johnson; Houlton; Vannini, 2005) Dos princípios da AO (Associação para questões de Osteossínteses/Davos), relativos à anatomia, estabilidade, biologia, e deambulação, contradizendo o que foi expresso e interpretado, nos 40 anos que se seguiram à criação da Associação e, que gradualmente mudou em resposta à soma de conhecimentos e compreensão baseados em estudos científicos e observação clínica. O que não mais permanece como princípio fundamental é:

- A) Promover uma estabilização no foco de fratura o mais rígida possível
- B) Reduzir e fixar fraturas, preservando funções anatômicas.
- C) Estabilizar e fixar, conforme atenção requerida à fratura e lesão.
- D) Preservar aporte sanguíneo local, aos tecidos moles e ossos
- E) Proporcionar deambulação precoce e segura ao paciente

09 - A não união do processo ancôneo em cão, trata-se de um acometimento essencialmente:

- A) Congênito
- B) Hereditário
- C) Familiar
- D) Adquirido
- E) Traumático

10 - (Denny; Butterworth, 2006) Acometimento ortopédico com distúrbio do crescimento em cães de raça gigante, diagnosticável em idade média de crescimento (cinco meses), frequentemente bilateral, ocorre encurvamento medial do fêmur distal, de forma que os joelhos tendem a se tocarem e a extremidade do membro está virada para fora. Trata-se de:

- A) Desnívelamento de platô tibial
- B) Genu varum
- C) Genu recurvatum
- D) Luxação patelar
- E) Genu valgum

11 - (Denny; Butterworth, 2006) A classificação de fraturas objetiva substanciar elementos para dirimir o protocolo à sua resolução da maneira mais apropriada a cada paciente. A utilização de tal sistematização também possibilita relatar as características da fratura para outro cirurgião Veterinário que não terá dificuldade em atendê-lo”. A classificação do tipo de fratura, quando considerando o deslocamento relativo dos fragmentos ósseos não inclui:

- A) Fratura por impactação
- B) Fratura por avulsão
- C) Fratura segmentária
- D) Fratura por impactação
- E) Fratura por depressão

12 - (Denny; Butterworth, 2006) As técnicas disponíveis ao tratamento cirúrgico de paciente com luxação patelar medial, podem ser agrupadas conforme os efeitos que possam produzir e ou a combinação de procedimentos. Dentre as técnicas que se seguem, a que não é apropriada à resolução de luxação patelar medial de cães é:

- A) Liberação do retináculo medial
- B) Osteotomia de nivelamento do platô tibial
- C) Aprofundamento do sulco intertroclear femural
- D) Transposição da tuberosidade tibial
- E) Reforço do retináculo lateralmente

13 - (Fossum, 2015) A técnica cirúrgica extracapsular, para reconstrução da função do ligamento cruzado cranial (LCCr) de cães é:

- A) Abordagem medial da Articulação femorotibiopatelar
- B) Avanço caudal da cabeça fibular
- C) Substituição do LCCr com fásia lata distal
- D) Abordagem lateral da Articulação femorotibiopatelar
- E) Estabilização por sutura fabelotibial lateral

14 - (Fossum, 2015) Em cão adulto, que apresenta luxação coxofemoral craniodorsal pós-trauma, sem avulsão de fôvea da cabeça femoral, apresenta quadril instável e não há comprometimento de músculos glúteos; não apresenta displasia coxofemoral, deve ser tratada o mais rapidamente possível visando evitar danos contínuos em tecidos moles adjacentes, à articulação coxofemoral e prejuízo à cartilagem articular. A estabilização da articulação mais apropriada a este paciente pela técnica menos invasiva é:

- A) Técnica de cavilha
- B) Osteotomia tripla
- C) Denervação na crista acetabular
- D) Capsulorrafia
- E) Translocação de trocânter maior

15 - (Fossum, 2015) A instabilidade atlantoaxial congênita e a traumática, em cão jovem está relacionada, respectivamente a:

- a) Agenesia do processo odontóide; fratura C2-C3
- b) Frouxidão do ligamento nugal; luxação atlantoaxial
- c) Fratura de processo odontóide; frouxidão de ligamento atlantoaxial dorsal
- d) Hipoplasia de processo odontóide; ruptura de ligamento transversal
- e) Síndrome Wobler

16 - Na laminetomia dorsal em que há uma exposição mais profunda, com exposição das faces dorsal, lateral e ventral do canal espinal, da medula espinal e das raízes nervosas espinais; indicada em necessidades máximas dentro dos limites de um comprimento vertebral, este procedimento deve ser pela técnica:

- A) Funkquist A
- B) Funkquist B
- C) Hemilaminectomia
- D) Corpectomia
- E) Laminectomia dorsal

17 - (Wheeler; Sharp, 1999) Em cão que apresenta compressão da medula espinal por protusão (Hansen II) de disco intervertebral com aspecto neuroclínico caracterizado por distúrbio da micção, com presença de bexiga tensa e difícil de ser comprimida, a lesão está ocorrendo no segmento:

- A) L4 – T13
- B) Sacrais ou raízes nervosas
- C) T3 – L3
- D) Lombares e raízes nervosas
- E) T1 – T13

18 - (Harari, 1999; Fossum, 2015) “Qual a alternativa é falsa com relação às hérnias diafragmáticas de origem traumática?”

- A) O fígado é comumente o órgão mais herniado
- B) Sua duração pode durar de horas a anos de idade
- C) A cirurgia deve ser realizada por toracotomia
- D) Se derrame pleural está presente, a ultrassonografia é recomendada
- E) A mortalidade é alta se cirurgiado em menos de 24 h ou 1 ano após

19 - (Fossum, 2015) Na dilatação vólculo-gástrica em cães, não:

- A) Ocorre deslocamento esplênico para a direita
- B) É uma afecção aguda com taxa de mortalidade de 20 a 40%
- C) É mais comum em cães de meia idade a idosos
- D) Ocorrem arritmias cardíacas associada a necrose gástrica
- E) Desloca o baço ventral e à esquerda abdominal, geralmente

20 - (Fossum, 2015) Em técnicas cirúrgicas pilóricas e gástricas devem-se evitar:

- A) Romper o ligamento gastrohepático
- B) Danificar o ducto biliar
- C) Uso de fios PDS
- D) Uso de fios poliglecaprona 25
- E) Gastropexia circunscostal

21 - (Fossum, 2015) O principal objetivo para indicação de piloroplastias consiste em:

- A) Diminuir o tempo de esvaziamento gástrico
- B) Estabelecer o escoamento gástrico benigno
- C) Aumentar o lúmen da alça
- D) Resolução de estenose pilórica
- E) Evitar regurgitação gástrica

22 - (Bojrab, 1991; Fossum, 2015) Em cão que apresenta hipospadia perineal com grande defeito, apresenta pêns subdesenvolvido, exclui-se a possibilidade de reconstrução prepucial ou uretral. A recomendação é que se realize:

- A) Uretrotomia pré-escrotal
- B) Castração e uretropexia escrotal
- C) Uretropexia glandular
- D) Castração e uretrotomia
- E) Uretrotomia perineal

23 - (Fossum, 2015) O acesso cirúrgico para realização de uma esplenoectomia total Eplenectomia é:

- A) Transversal retrocostal esquerdo
- B) Transversal retrocostal direito
- C) Da apófise xifoide a retro-umbilical
- D) Abdominal lateral direito
- E) Abdominal lateral esquerdo

24 - (Fossum, 2015) Em cães acometidos por Colapso traqueal grau II, o tratamento é:

- A) Dispensável
- B) Uso de próteses anelares e suturas
- C) Uso de próteses espiraladas e suturas
- D) Colocação de Stent de polímeros
- E) Conservativo, sintomático

25 - (Bojrab, 1991; Fossum, 2015) é enfermidade em que em paciente canina, no período de estro, apresenta deslocamento em até 360° da mucosa vaginal:

- A) Prolapso vaginal
- B) Hiperplasia vaginal
- C) TVT
- D) Edema vaginal
- E) Enfermidade de Kaslick

26 - Segundo a Lei nº 8.080/90 - SUS, é INCORRETO afirmar:

- A)** Compete à direção municipal do SUS participar do planejamento, programação e organização da rede regionalizada e hierarquizada do SUS, em articulação com sua direção estadual.
- B)** Compete à direção estadual do Sistema Único de Saúde (SUS) formular normas e estabelecer padrões, em caráter suplementar, de procedimentos de controle de qualidade para produtos e substâncias de consumo humano;
- C)** Compete à direção estadual do Sistema Único de Saúde (SUS) estabelecer normas e executar a vigilância sanitária de portos, aeroportos e fronteiras, podendo a execução ser complementada pelo Distrito Federal e Municípios.
- D)** Compete à direção nacional do Sistema Único da Saúde (SUS) prestar cooperação técnica e financeira aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios para o aperfeiçoamento da sua atuação institucional.
- E)** Compete à direção nacional do Sistema Único da Saúde (SUS) controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde;

27 - Segundo a Seção II da Constituição Federal de 1988, no que se refere à saúde é INCORRETO AFIRMAR:

- A)** O SUS tem como característica ser descentralizado, com direção única em cada esfera de governo.
- B)** Quando for necessário, o contrato de serviços de saúde fora da rede própria do Sistema Único de saúde deverá priorizar as fundações e os hospitais-escola.
- C)** Compete ao sistema único de saúde, além de outras atribuições, executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador.
- D)** O sistema único de saúde tem como características ser descentralizado, hierarquizado e regionalizado.
- E)** Os critérios de rateio dos recursos da União vinculados à saúde tem como objetivo a progressiva redução das disparidades regionais.

28 - A Portaria Nº 1.399, de 15 de dezembro de 1999 regulamenta a Norma Operacional Básica do SUS 01/96, estabelece competências da União, estados, municípios e Distrito Federal, na área de epidemiologia e controle de doenças além de definir a sistemática de financiamento. Neste contexto, compete aos municípios realizar:

- A)** Notificação de doenças de notificação compulsória, surtos e agravos inusitados, conforme normatização federal e estadual.
- B)** Coordenação nacional das ações de Epidemiologia e Controle de Doenças, com ênfase naquelas que exigem simultaneidade nacional ou regional para alcançar êxito.
- C)** Definição de Centros de Referência Nacionais de Epidemiologia e Controle de Doenças.
- D)** Coordenação e supervisão das ações de prevenção e controle, com ênfase naquelas que exigem simultaneidade estadual ou microrregional para alcançar êxito.
- E)** Gestão dos estoques estaduais de insumos estratégicos, inclusive com abastecimento dos municípios.

29 - PORTARIA Nº 399 de fevereiro de 2006, estabelece as Diretrizes Operacionais do Pacto pela Saúde em 2006 – Consolidação do SUS com seus três componentes: Pactos Pela Vida, em Defesa do SUS e de Gestão. Nos termos da portaria, são prioridades e objetivos do pacto pela vida, EXCETO:

- A) Reduzir a mortalidade materna, infantil neonatal, infantil por doença diarreica e por pneumonias.
- B) Fortalecer a capacidade de resposta do sistema de saúde às doenças emergentes e endemias.
- C) Contribuir para a redução da mortalidade por câncer de colo do útero e de mama
- D) Implantar a Política Local de Saúde da Pessoa Jovem e Adolescente, por meio de parcerias com instituições privadas e organizações não-governamentais, proporcionar atendimento especializado e garantir apoio psicológico.
- E) Consolidar e qualificar a estratégia da Saúde da Família como modelo de atenção básica à saúde e como centro ordenador das redes de atenção à saúde do SUS.

30 - Nos termos da lei nº 8.080/90, assinale a alternativa que completa correta e sequencialmente a afirmativa a seguir:

“Entende-se por _____ um conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou _____ riscos à saúde e de intervir nos problemas _____ decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde.” (Lei nº 8.080/90 – art. 6º, 1º§)

- A) assistência à saúde / analisar / sanitários
- B) vigilância epidemiológica / controlar / agravados
- C) vigilância sanitária / controlar / imunobiológicos
- D) vigilância epidemiológica / eliminar / sociais
- E) vigilância sanitária / prevenir / sanitários