



**PROCESSO SELETIVO PARA RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL
E EM ÁREA PROFISSIONAL DA SAÚDE
EDITAL PROPPG UFERSA 37/2019**



PROVA ESCRITA OBJETIVA - 02/12/2019
CADERNO DE QUESTÕES

ÁREA: CLÍNICA CIRÚRGICA DE ANIMAIS DE COMPANHIA

CANDIDATO	Nº INSCRIÇÃO

INSTRUÇÕES

- A prova terá duração mínima de 1 (uma) hora e máxima de 4 (quatro) horas. O candidato que se ausentar antes do prazo mínimo estipulado (1 hora) será eliminado do Processo Seletivo.
- Na Prova Escrita Objetiva, o preenchimento da Folha de Respostas será de inteira responsabilidade do candidato, que deverá proceder conforme as instruções deste Edital e do Fiscal.
- O candidato deverá preencher os alvéolos, na Folha de Respostas da Prova Escrita Objetiva, com caneta esferográfica transparente de tinta preta ou azul.
- Não serão computadas questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, emenda ou rasura, ainda que legível.
- Os prejuízos advindos de marcações feitas incorretamente na Folha de Respostas serão de inteira responsabilidade do candidato, não havendo substituição da Folha de Respostas por erro do candidato.
- O candidato, ao terminar a prova, entregará ao fiscal juntamente com a Folha de Respostas, o Caderno de Questões.

01 - Em cirurgias na cavidade oral, Fossum (2015) relata que “A cavidade oral e a orofaringe apesar de contaminada por bactérias aeróbicas, facultativas e anaeróbicas além do eficiente aporte sanguíneo à região... são raras as infecções após cirurgia na boca”. Outra característica considerada pela autora na manutenção da infecção sob controle nesta região, refere-se particularmente:

- a) Ao Efeito antimicrobial da saliva
- b) À aplicação de antibiótico feita preventivamente
- c) Às bactérias aeróbicas, predominantes, são mais facilmente controladas
- d) À Excelente biodisponibilização do fármaco antibiótico
- e) À disponibilidade, no mercado, de antibióticos mais eficientes

02 - (FOSSUM, 2015). Analise as afirmativas sobre mucoceles salivares.

- I. Mucoceles salivares são cavidades revestidas por epitélio produzido secundariamente à inflamação causada pela saliva livre nos tecidos.
- II. As causas das mucoceles salivares raramente são identificadas, apesar de traumas contusos, corpos estranhos e sialolitíases serem sugeridas.
- III. A excisão da glândula parótida, ocasionalmente, é realizada devido a neoplasia, fístula, infecção crônica ou mucocele.
- IV. Complicações pós-operatórias após exérese de glândulas salivares são incomuns, mas podem incluir formação de seroma, infecção e recorrência de mucocele.

Quais afirmativas estão CORRETAS?

- a) Apenas I
- b) Apenas I e II
- c) Apenas II, III e IV
- d) Todas as afirmativas
- e) Nenhuma das afirmativas

03 – Fossum (2015) preconiza que o acesso cirúrgico de eleição para retirada de corpo estranho esofágico localizado na base cardíaca é feito através da toracotomia pelo:

- a) 4º ou 5º espaço intercostal direito
- b) 9º espaço intercostal esquerdo
- c) 7º espaço intercostal direito
- d) 8º ou 9º espaço intercostal direito ou esquerdo
- e) 8º ou 9º espaço intercostal direito ou direito

04 - A coaptação externa, para estabilizar a fraturas indiretamente, em que tecidos moles permanecem interpostos entre o material relativamente rígido e o osso, promovendo imobilização pouco estável da fratura não inclui o uso de:

- a) Talas
 - b) FEE
 - c) Bandagens
 - d) Muletas
 - e) Tipóias
-

05 - A técnica imagística diagnóstica considerada “padrão ouro” no diagnóstico de traumas na coluna vertebral é:

- a) Fluoroscopia
- b) Ressonância magnética
- c) Mielografia
- d) Radiografia
- e) Tomografia computadorizada

06 - Luxações traumáticas em cotovelo de cães devem ser diferenciadas de:

- a) Ruptura de ligamentos colaterais
- b) Displasia
- c) Luxação congênita
- d) Fraturas articulares e de Monteggia
- e) Fechamento prematuro de fises

07 - “A luxação coxofemoral deve ser tratada o mais rápido possível, para evitar lesões contínuas dos tecidos moles que circundam a articulação do quadril e a degeneração da cartilagem articular”. Qual das técnicas que se seguem é utilizada para redução fechada em luxação coxofemoral craniodorsal.

- a) Técnica de pino em cavilha
- b) Tala de Valpeau
- c) Técnica de capsulorrafia
- d) Tala de Ehmer
- e) Inserção de prótese em cápsula

08 - Com relação às luxações patelares em cães, assinale V (verdadeiro) ou F (falso).

() Cães de qualquer idade, raça ou sexo podem apresentar luxações patelares mediais, mas as raças pequenas e miniaturas são acometidas com maior frequência.

() Luxações patelares mediais são mais comuns que as luxações patelares laterais nos cães de raças grandes; entretanto, estas raças apresentam uma porcentagem maior de luxações laterais que os cães pequenos.


() A cirurgia é indicada para pacientes sintomáticos imaturos ou jovens adultos, pois a luxação patelar intermitente pode desgastar, prematuramente, a cartilagem articular da patela.

() O sistema para classificação do acometimento de luxação patelar canina descrito na literatura estima os graus em I, II, III, IV e V.

Assinale a alternativa que representa a sequência correta.

- a) V – V – V – F
 - b) F – F – F – V
 - c) V – F – F – F
 - d) F – F – V – V
 - e) V – F – F – F
-

09 - A figura abaixo (MUZZI, 2013) ilustra técnica de imobilização preconizada por:



- a) Robert Jones
- b) Valpeau
- c) Schroeder-Thomas
- d) Mayo
- e) Olmstead

10 - Em lesão grave da medula espinal, “o desenvolvimento de mielomalácia focal ou difusa (liquefação do parênquima medular espinal) é uma preocupação em cães que perderam a percepção à dor e pode geralmente ser descartada somente na cirurgia via:

- a) Laminectomia dorsal
- b) Hemilaminectomia
- c) Durotomia
- d) Funkist A
- e) Fenestração

11 - Principal indicador de prognóstico à viabilidade deambulatória após trauma em medula espinal de cão é:

- a) Resposta reflexa cutânea caudal
- b) Resposta nociceptiva à dor profunda
- c) Propriocepção diminuída
- d) Reflexo patelar aumentado
- e) Reflexo do pânículo diminuído

12 - Paciente canino apresenta incontinência urinária neurogênica, à palpação, com bexiga repleta, flácida e facilmente compressível. Estes sinais neuroclínicos estão geralmente associados a lesões:

- a) No tono do esfíncter uretral (aumentado)
 - b) Do NMS, com bexiga tensa e difícil de ser comprimida
 - c) No NMI, com lesões de segmentos sacrais da ME ou raízes nervosas
 - d) Afetando o segmento medular T3 - L3
 - e) Craniais aos segmentos sacrais
-

13 - A técnica em que é realizada pilorectomia associada a gastroduodenostomia é referida por:

- a) Gastropilorooplastia de Heineke-Mikulicz
- b) Gastrectomia e invaginação gástrica
- c) Gastroduodenostomia
- d) Piloromiotomia de Fredet-Ramstedt
- e) Billroth I

14 - Em paciente canino que cirurgiado para redução de hérnia perianal, apresentou, no pós-operatório, com dor intensa, claudicação sem suporte de peso e articulações de dígitos após a cirurgia. Estes sinais clínicos são sugestivos de:

- a) Saculite anal
- b) Infecção local
- c) Recidiva de herniação
- d) Deiscência de suturas
- e) Compressão em nervo ciático

15 - Analise as afirmativas de Fossum (2015) na patofisiologia da obstrução intestinal por corpos estranhos de cães, conforme segue.

I. O suprimento arterial não é afetado, e aumenta a pressão hidrostática no leito capilar, produzindo uma transferência líquida de fluido para o interstício e causando edema da parede intestinal.

II. A circulação na mucosa e submucosa é prejudicada, o consumo de oxigênio aumenta, ocorrem desvios arteriovenosos e a mucosa se torna isquêmica.

III. Obstruções mais proximais e completas causam sinais mais agudos e graves, com uma probabilidade aumentada de desidratação, desequilíbrio eletrolítico e choque. As obstruções proximais ou altas (i.e., duodeno ou jejuno proximal) causam vômito persistente, perda de secreções gástricas, desequilíbrios eletrolíticos e desidratação.

IV. As obstruções distais ou baixas (i.e., jejuno distal, íleo e junção ileocecal) causam graus variáveis de acidose metabólica. Os sinais clínicos de obstruções distais e incompletas podem estar insidiosos, com anorexia vaga intermitente, letargia, diarreia e vômitos ocasionais abrangendo vários dias ou semanas.

Qual(is) afirmativa(s) está(ão) CORRETA(S)?

- a) Apenas I
 - b) Apenas I e II
 - c) Apenas I, III e IV
 - d) Todas as afirmativas
 - e) Nenhuma das afirmativas
-

16 - Procedimentos ortopédicos objetivando corrigir o nivelamento do platô tibial pela técnica de osteotomia cuneiforme da porção cranial tibial, por rotação do platô tibial ou por avanço da crista tibial são técnicas utilizadas para:

- a) Estabilizar tensão no ligamento cruzado cranial
- b) Ruptura do ligamento cruzado cranial
- c) Luxação patelar
- d) Subluxação do joelho
- e) Displasia coxofemoral

17 - (SLATTER, 2007) Já descrito em cães e gatos, divertículos vesicouracais microscópicos quanto macroscópicos, são clinicamente relevantes em cães quando apresentam infecções recidivantes do trato urinário. Cães com esta enfermidade podem estar predispostos à formação de urólitos de fosfato de magnésio e amônio. O tratamento é a cistectomia parcial-diverticulectomia e o diagnóstico é estabelecido por:

- a) Radiografia com contraste negativo
- b) Cistosgrafia com duplo contraste
- c) Ressonância magnética
- d) Radiografia simples
- e) Fluoroscopia

18 - (SLATTER, 2007) A ausência de fusão das pregas urogenitais, resultando na formação incompleta da uretra peniana, com ausência ou subdesenvolvimento do pênis é denominada:

- a) Ectopia uretral
- b) Epispádia
- c) Uretra imperfurada
- d) Hipospádia
- e) Fístula uretroretal

19 - A complicação tardia mais relevante após uretostomia perineal em gatos pode ser melhor tipificada por:

- a) Formação de tecido de granulação
 - b) Lesão em glândula bulbouretral
 - c) Celulite subcutânea
 - d) Formação de estenose
 - e) Prolapso retal
-

20 - Não há provas de que o uso intravenoso de fluoresceína seja um método acurado para determinar a viabilidade tecidual em cães com DVG. Geralmente, se houver dúvida quanto a viabilidade do tecido gástrico. Para evitar possível perfuração, peritonite e óbito, a parede gástrica severamente afetada deverá ser:

- a) Omentalizada
- b) Criocirurgiada
- c) Gastroduodenonectomizada
- d) Gastrojejunostemectomizada
- e) Removida ou invaginada

21 - Embora controverso, na comunidade científica veterinária, os resultados apresentados por Fossum (2015) recomendam uso de técnica, em intestino, realizada para prevenir a recorrência de intussuscepções intestinais. Esta técnica é:

- a) Plicatura
- b) Enterorafia
- c) Enterostomose
- d) Enteroenterostomose
- e) Enteroderência

22 - À coleção de fluido linfático originado do intestino e que, portanto, contém uma grande quantidade de gordura, acumulada no espaço torácico é denominada:

- a) Colesterol do fluido pleural
- b) Efusão pericárdica
- c) Linfangiectasia
- d) Efusão de pseudoquilo
- e) Quilotórax

23 - “Anomalias do anel vascular ocorrem tanto em cães quanto em gatos, a enfermidade é mais comum em cães Pastores Alemães, Irish Setters e Boston Terriers. Arco aórtico direito persistente pode ser uma condição hereditária em Greyhounds. Em gatos, as raças mais comumente afetadas” segundo Fossum (2015) são:

- a) Angorá e Bombaim
- b) Siamês e persa
- c) Birmanês e SRD
- d) Minskin e Angorá
- e) Van Turco e Ocicat

24 - A incontinência urinária pode ocorrer devido a múltiplos fatores, EXCETO:

- a) Falha no esfíncter vesical
 - b) Ureteres tópicos
 - c) Anormalidades neurogênicas
 - d) Obstrução anatômica
 - e) Inflamações
-

25 - A ultrassonografia FAST tem sido defendida em hemodinamicamente instáveis, utilizada em pacientes com trauma abdominal fechado para determinar a gravidade de sua doença e se eles são candidatos a cirurgia por dar uma rápida avaliação de lesões. Introduzido na década de 1990, vem sistematicamente substituindo a LPD (abdominocentese ou lavagem peritoneal diagnóstica). Este exame apresenta a desvantagem de:

- a) Inespecífico em apontar origem hemorrágica e gravidade da lesão
- b) Diagnosticar de hemorragia associada com trauma contuso
- c) Sensível para lesões e complicações tardias
- d) Baixa sensibilidade
- e) Alto custo dos exames

26 - A epidemiologia é a ciência básica e fundamental para a saúde pública e efetivação do SUS. Sobre Epidemiologia não é correto afirmar:

- a) História natural da doença é o conjunto de processos interativos que compreendem as inter-relações do agente, do suscetível e do meio ambiente que afetam o processo global e seu desenvolvimento.
- b) A história natural da doença tem desenvolvimento em dois períodos seqüenciados: o período epidemiológico e o período patológico. Abrange, portanto, dois domínios interagentes, consecutivos e mutuamente exclusivos.
- c) O conhecimento de padrões de distribuição de doenças e agravos nas coletividades é condição secundária para a suspeição dos determinantes centrais envolvidos no processo saúde-doença, possibilitando indicação futura de medidas de prevenção e controle.
- d) Estudos descritivos possibilitam a geração de tendências epidemiológicas, por meio das quais se procura prever cenários com base no conhecimento histórico do comportamento temporal e espacial de doenças.
- e) Os elementos fornecidos pela epidemiologia descritiva fornecem os primeiros indícios a respeito dos determinantes das doenças, o que levam a formulação de hipóteses relacionadas aos fatores de risco ou causas das doenças.

27 - Sobre a criação e funcionamento do SUS, marque a alternativa correta:

- a) A Constituição Brasileira de 1988 incluiu, pela primeira vez, uma seção sobre a saúde e dita que cabe ao poder público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, somente por pessoa jurídica de direito privado.
 - b) A assistência à saúde é livre à iniciativa privada, sendo vedada a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas sem fins lucrativos.
 - c) As ações e serviços de saúde, executados pelo Sistema Único de Saúde, serão organizados de forma regionalizada e hierarquizada em níveis de complexidade decrescente.
 - d) Ao sistema único de saúde compete, além de outras atribuições, controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde e participar da produção de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos.
 - e) A integralidade da assistência é entendida como conjunto articulado e contínuo das ações para o acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência.
-

28 - Quanto às atribuições do SUS, é incorreto afirmar:

- a) Acompanhamento, avaliação e divulgação do nível de saúde da população e das condições ambientais.
- b) Elaboração da proposta orçamentária do Sistema Único de Saúde (SUS), de conformidade com o orçamento dos órgãos de fiscalização da União.
- c) Participação de formulação da política e da execução das ações de saneamento básico e colaboração na proteção e recuperação do meio ambiente.
- d) promover articulação com os órgãos de fiscalização do exercício profissional e outras entidades representativas da sociedade civil para a definição e controle dos padrões éticos para pesquisa, ações e serviços de saúde.
- e) Cabe ao SUS a revisão periódica da listagem oficial de doenças originadas no processo de trabalho, tendo na sua elaboração a colaboração das entidades sindicais.

29 - A Portaria nº 399/2006 divulga o Pacto pela Saúde para a consolidação do SUS e aprova as Diretrizes Operacionais do referido Pacto. Dentre as afirmativas abaixo não é correto afirmar:

- a) O Pacto pela Vida é o compromisso entre os gestores do SUS em torno de prioridades que apresentam impacto sobre a situação de saúde da população brasileira, dentre as prioridades pactuadas está o fortalecimento da capacidade de respostas às doenças emergentes e endemias.
- b) O fortalecimento da atenção básica inclui o desenvolvimento de ações de qualificação dos profissionais da atenção básica por meio de estratégias de educação permanente e de oferta de cursos de especialização e residência multiprofissional.
- c) O Pacto em Defesa do SUS envolve ações concretas e articuladas pelas três instâncias federativas no sentido de reforçar o SUS como política de Estado mais do que política de governos; e de defender os princípios basilares dessa política pública, inscritos na Constituição Federal.
- d) Dentre as prioridades do Pacto em Defesa do SUS está a implementação de um projeto permanente de mobilização social com a finalidade de mostrar a saúde como direito de cidadania e o SUS como sistema público universal garantidor desses direitos.
- e) Um dos objetivos da Regionalização é garantir acesso, resolutividade e qualidade às ações e serviços de saúde cuja complexidade e contingente populacional transcenda a escala estadual.

30 - Sobre as Diretrizes Nacionais da Vigilância em Saúde é correto afirmar:

- a) A vigilância em saúde detém conhecimentos e metodologias que auxiliam a gestão para o conhecimento da realidade, identificação de problemas, estabelecimento de prioridades de atuação e melhor utilização dos recursos em busca de resultados efetivos, fundamentais para a elaboração do planejamento.
 - b) Vigilância sanitária é o conjunto de ações que proporciona o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes da saúde individual ou coletiva.
 - c) A vigilância ambiental é entendida como um conjunto de ações capazes de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, na produção e circulação de bens e na prestação de serviços de interesse da saúde.
 - d) A vigilância em saúde do trabalhador caracteriza-se por ser um conjunto de atividades destinadas prioritariamente à recuperação e reabilitação da saúde dos trabalhadores submetidos aos riscos e agravos advindos das condições de trabalho.
 - e) A vigilância sanitária tem como funções, dentre outras: coleta e processamento de dados; análise e interpretação dos dados processados; divulgação das informações; análise dos resultados obtidos; e recomendações e promoção das medidas de controle indicadas.
-